

# 最新护理三基三严700道题库5篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/214704.html>

## ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

### 护理三基三严700道题库篇一

测\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_至平稳。

)

- a、洗手护士腰以下，背部和肩部以上都应视为有菌区不能接触
- b、下坠超过手术台边以下的器械不能用
- c、器械不能从手术者背后递送
- d、手套接触非无菌区后，应酒精消毒
- e、前臂或肘部碰触有菌地方，应更换无菌手术衣或加套无菌袖套

) a、呼吸快而浅

b、呼吸慢而浅

c、尿液呈碱性

d、钾离子进入细胞内

e、呼吸深而快

) a、血压稍低，脉快，脉压缩小

b、血压稍低，脉快，脉压正常

- c、血压稍升高，脉搏无变化，脉压缩小
- d、收缩血压正常或稍高，脉稍快，脉压缩小
- e、血压稍升高，脉细速，脉压缩小

) a、血容量变化情况

b、周围血管阻力变化情况

c、心排血量变化情况

d、脑部血液灌流情况

e、组织缺氧程度

)

a、由细菌毒素进入血液而引起症状者

b、仅化验发现血液已有细菌而无症状者

c、血内既有细菌也有细菌毒素并产生症状者

d、化脓菌栓子进入血液并随血流播散而不断产生症状者

e、以上均不是

)

a、咽肌

b、面肌

c、咀嚼肌

d、颈背肌

e、腹肌

)

a、强烈痉挛引起的骨折

b、水、电解质平衡紊乱

c、急性肾功能衰竭

d、心力衰竭

e、窒息

)

a、4小时

b、5~6小时

c、7~10小时

d、12~36小时

e、48~72小时

)

a、切口情况

b、腹痛情况

c、体温变化

d、出血情况

e、肛门排气、排便情况

)

a、腹股沟疝术后，应在患侧膝下垫一小枕头

b、择期手术前，应治愈或控制可引起腹内压升高的症状

c、股疝和腹股沟疝术前应严格准备会阴部皮肤

d、腹股沟斜疝术后阴囊托起是无意义的

e、术后3个月内应避免重体力劳动

)

a、梗阻的原因多是结石、寄生虫或胆管狭窄

- b、病人过去可有反复发作的胆管炎史
- c、起病急，右上腹绞痛，高热寒颤，黄疸
- d、烦躁、嗜睡、昏迷、血压下降
- e、血培养可能阳性，但胆囊一定能触到

)

- a、产后哺乳期的经产妇
- b、产后哺乳期的初产妇
- c、任何哺乳期的妇女
- d、青年产妇
- e、乳房较大的产妇

)

- a、禁食、禁饮
- b、胃肠减压
- c、严密观察生命体征和腹部情况
- d、应用抗生素和止痛药

)

- a、粘连性肠梗阻
- b、绞窄性肠梗阻
- c、胆道蛔虫病
- d、输尿管结石
- e、小儿肠套叠

) a、脑水肿

b、脑溢血

c、肾功能衰竭

d、急性重型肝炎

e、循环衰竭

)

a、子宫收缩力

b、腹肌收缩力

c、提肛肌收缩力

d、圆韧带的收缩力

e、四肢骨骼肌收缩力

)

a、阴道出血，胎膜破裂，先露未衔接

b、臀位、横位

c、估计1小时内结束分娩

d、枕横位及枕后位

e、严重妊娠中毒症及心脏病

)

a、月经后3~7天

b、平产3个月后

c、剖腹产后6个月

d、人工流产后立即

e、引产后立即

)

a、影响内脏的气机，使气机升降失常，气血功能紊乱

- b、七情属于人的正常精神活动，不论在什么情况下，都不致病
  - c、一般情况下，七情可引起体内阴阳气血失调，脏腑经络功能紊乱
  - d、七情致病与内脏密切相关，不同的持久情志变化对内脏有着相同的影响
  - e、以上都不是
- ) a、风、湿
- b、寒、火
  - c、暑
  - d、燥
  - e、以上都是
- )
- a、淡白舌、红舌
  - b、紫舌
  - c、淡黄舌
  - d、淡红舌
  - e、绛舌
- 22、何谓中药的四气 ( )
- a、是指中药的四种特殊气味
  - b、寒凉药具有散寒、助阳的作用
  - c、是指中药的寒、热、温、凉四种药性
  - d、是指中药的辛、咸、甘、苦四种味道
  - e、温热药具有清热、解毒的作用
- ) a、治病求本、扶正祛邪
- b、整体观念、辩证治疗

c、调整阴阳

d、调整脏腑功能

e、调整气血关系，相因制宜

)

a、某些刺激性强的化疗药物不可漏出血管外

b、抗癌药物漏出血管，局部肿痛，应热敷，帮助消散

c、定期查血象，以了解有无骨髓抑制现象

d、若出现胃肠反应，可用巴比妥、冬眠灵、灭吐灵等药减轻反应

e、病人出现脱发现象，应立即停药

)

a、手术台边缘以下的布单不能接触

b、切开肠腔前应先用纱布垫保护好

c、无菌区布单沾湿时应加盖无菌巾

d、缝皮肤前须用碘酊、酒精消毒

e、手套破了用碘酊、酒精消毒手指

) a、术后7天可以进行造影检查

b、造影前用生理盐水冲洗胆道

c、造影是为了使胆道充分显影，可改变患者体位

d、造影后应开放t型管引流

e、造影后有发热时可用抗生素

)

a、不用处理

b、用棉签或钳子夹掉

c、报告医生

d、观察结节发展情况

e、观察结节有无活动性出血

)

a、孕期营养需要增加

b、母体基础代谢增高

c、胎儿的代谢产物经母体排泄

d、孕期雌激素分泌增加

e、妊娠期间血容量增加

)

a、呼吸每分钟少于16次

b、膝反射消失

c、尿量每日少于600ml

d、心率每分钟大于110次

e、血压小于12/9kpa

)

a、治病求本

b、整体观念

c、扶正祛邪

d、辩证论治

e、调整阴阳

)

a、寒、热

b、闻、问

c、表、里

d、虚、实

e、望、切

)

a、排空膀胱，防止发生尿潴留

b、测量尿量、比重，了解肾脏功能

c、观察体内有毒物质排出情况

d、观察病情以指导治疗

e、便于随时检查尿生化的变化 30、术后尿潴留患者的护理要点 (

)

a、耐心解释以缓解焦急心情

b、酌情改变体位协助患者排尿

c、局部热敷，按摩下腹部

d、用温水冲洗会阴部

e、床单位用屏风遮挡

**护理三基三严700道题库篇二**

2015年护理三基三严试题

科室：姓名：得分：

( )

( )

( )

( )

( )

分钟、120分钟、180分钟时各抽血1次测血糖及胰岛素。( )

( )

( )

( )

( )

( )

) a、12g b、10g c、8g d、6g e、4g

)

a、5次 b、10次 c、18次 d、20次 e、25次

)

a、每搏量 b、心率 c、外周阻力 d、大动脉弹性 e、循环血量/血管容量比例

)

a、第一狭窄部相当于第7颈椎的下缘 b、第二狭窄部距中切牙20cm  
c、第二狭窄部相当于胸骨角平面 d、第三狭窄部相当于第11胸椎平面  
e、第三狭窄部距中切牙45cm

) a、1/4 b、1/3 c、1/2 d、2/3 e、2/5

)

a、支气管扩张 b、慢性支气管炎 c、肺结核 d、支气管肺癌 e、风湿性心脏病二尖瓣狭窄

) a、神志改变 b、多饮多尿症状明显 c、局限性抽搐 d、血压偏低 e、食欲减退

)

a、子宫全切 b、子宫颈全切 c、定期复查 d、雌激素治疗 e、孕激素治疗

)

a、少尿、水肿 b、少尿、高血压 c、血尿、水肿、高血压 d、血尿、水肿、高血压、肾功能衰竭  
e、水肿、高血压

)

a、心力衰竭 b、脑血栓 c、肺水肿 d、脑膜炎 e、肺炎

)

a、感觉异常 b、疼痛 c、苍白 d、体温下降 e、发绀

)

a、 abcb、 cabd、 bacd、 cba

)

a 判断如无意识、立即呼救、触摸颈动脉如无搏动，则予以cpr b  
立即呼叫并等待医院急诊科120来人抢救

c单纯使用肾上腺素1mg皮下注射 d 只是给予吸氧并等待；

) a、用氧枕给予氧气吸入10分钟，然后观察

b、立即停药，就地抢救，立即皮下注射肾上腺素1毫克

c、严密观察，等待病人自行缓解 d、即呼叫并等待急诊科120来人；

)

a、断电，判断无意识后，应就地抢救，遵医嘱皮下注射肾上腺素1毫克 b、断电，  
判断如无颈动脉搏动，则予以cpr c、断电，立即呼叫并等待急诊科来人

d、断电，通知120医师来处理该病人；

)

a . 心内注射 b . 气管内给药 c . 静脉给药 d . 肌肉注射 e . 皮下注射

)

a.大动脉搏动消失 b.呼吸停止 c.瞳孔散大 d.血压测不到 e.脉搏不清

) a.迅速开始人工呼吸 b.待心电图确诊后开始胸外按压

c.立即开放静脉输液通道 d.立即开始胸外按压 e.准备好电击除颤

人一起到病人床边进行核对（包括：、、、）后采集血样。做到“ ”、“ ”、“ ”  
三者无误后方可抽血。有两个以上病人需同时配血时，应做到一次配血。

年。

做好接收准备。

次，按压深度是至少 厘米，按压和通气比是

秒；

秒。

(12分)

2015年护理三基三严试题（答案）

)

)

)

)

×)

)

)

)

)

)

)

d)

)

a)

b)

)

c)

c )

c )

)

b )

)

处理原则：及时施行胸腔闭式引流进行减压是处理纵隔气肿的关键。由肺泡破裂造成的纵隔气肿，呼吸循环功能受影响者，可在颈根部做一切口排气，紧急需要还可在胸骨切迹上方，切开皮下组织及气管前筋膜，使气体排出；亦可在皮下气肿张力最大处，做小切口减压。如患者已做气管切开术，为避免造成纵隔感染，此时可在两侧锁骨上切开减压。

### 护理三基三严700道题库篇三

永年县第二医院

护理三基三严考试题

)

a.促进炎症的消散和局限 b.减轻深部组织充血 c.解除疼痛 d.制止炎症扩散或化脓 e.保暖

2.以下有关输液的叙述不正确的是 ( d )

a.需长期输液者，一般从远端静脉开始 b.需大量输液时，一般选用较大静脉

c.输入多巴胺时应调节较慢的速度 d.连续24小时输液时，应每12小时更换输液管

e.颈外静脉穿刺拔管时在穿刺点加压数分钟，避免空气进入 3.属于中效化学消毒剂的是 ( a )

a.碘伏 b.甲醛 c.氯己定 d.过氧化氢 e.过氧乙酸 4.有机磷农药中毒病人的瞳孔表现为 ( b )

a.双侧瞳孔扩大 b.双侧瞳孔缩小 c.双侧瞳孔突然扩大 d.双侧瞳孔忽大忽小 e.单侧瞳孔扩大.固定

5.输入高浓度葡萄糖的目的是 ( e )

a.纠正酸中毒 b.增加血粘度 c.供给热量补充营养 d.补充体液和电解质 e.脱水、利尿，防治脑水肿

6.采集粪便查寄生虫虫卵时应采集 ( d )

a.全部脓血部份的粪便 b.全部黏液部份的粪便 c.边缘部份带血及黏液的粪便

d.不同部份带血及黏液的粪便 e.中间部份带血及黏液的粪便 7.下列哪一项不是输液的目的 ( d )

a.纠正水电解质失调 b.增加血容量 c.输入药物 d.供给各种凝血因子 e.利尿消肿

8.留取血吸虫孵化检查的粪便标本应 ( b )

a.于进试验饮食3~5天后留取 b.留全部粪便及时送检 c.将便盆加热后留取全部粪便

- d.用竹签取脓血粘液粪便置培养管内 e.取少量异常粪便置蜡纸盒内送检  
9.对输血目的的描述，错误的是（c）
- a.纠正低蛋白血症 b.补充血红蛋白 c.维持酸碱平衡 d.补充循环血量 e.预防及控制出血  
10.病人取坐位时，最易发生压疮的部位是（d）
- a.髌部 b.骶尾部 c.髂前上棘处 d.坐骨结节处 e.脊椎棘突处 11.保存要素饮食的要求是（d）
- a.常温下保存24小时 b.12 冰箱中保存48小时
- c.8 冰箱中保存1周 d.4 冰箱中保存24小时 e.0 冰箱中保存48小时  
12.金黄色葡萄球菌肺炎应用抗生素的时间正确的是（a） a.体温正常后5~7日  
b.临床症状基本消失后3天 c.临床基本症状消失后至少2周 d.体温正常后2周，总疗程6周  
e.体温正常后1周，总疗程1个月 13.颅底骨折的主要依据诊断是（c）
- a.头部外伤史 b.软组织淤血斑 c.脑脊液外漏 d.颅神经损伤 e.颅内高压征  
14.急性胰腺炎的预防措施（c）
- a.应用阿托品类药物减少胰液分泌 b.服用制酸剂减少胃酸  
c.治疗胆道疾病，避免暴饮暴食及酗酒 d.应用抑肽酶制剂 e.应用硫唑嘌呤减少免疫反应  
15.急产是指总产程在（b）
- a.7h内 b.3h内 c.4h内 d.5h内 e.6h内 16.最严重的心源性呼吸困难是（b）
- a.心源性哮喘 b.端坐呼吸 c.劳力性呼吸困难 d.急性肺水肿 e.阵发性夜间呼吸困难  
17.有机磷农药中毒时瞳孔（b）
- a.散大 b.缩小 c.双侧等大、直径3~4mm d.双侧不等大 e.对光反射消失  
18.正常人的关节腔内的滑液量是（a）
- a.小于3.5ml b.4.0~4.5ml c.5.0~5.5ml d.6.0~6.5ml e.7.0ml  
19.在注射胰岛素时，需经常更换注射部位的原因是（a）
- a.防止注射部位组织硬化 b.防止胰岛素吸收过多 c.防止低血糖反应 d.防止血管闭塞  
e.防止过敏反应 20.法洛四联症患儿脑缺氧发作时，应采取的体位是（d）
- a.俯卧位 b.平卧位 c.半坐卧位 d.膝胸卧位 e.侧卧位 21.学龄儿童发生泌尿道感染的主要途径是（d）
- a.泌尿道先天畸形 b.血行感染 c.淋巴感染 d.上行感染 e.下行感染 22.大量咯血是指（d）
- a.一次咯血量小于100ml b.一次咯血量大于100ml c.一次咯血量大于200ml d.大于300ml  
e.24小时内咯血量大于300ml 23.下列避孕方法中失败率较高的是（e）
- a.放置宫内节育器 b.按期口服避孕药 c.使用避孕套 d.避孕针 e.安全期避孕  
24.全脊椎麻醉的主要危险是（d）

a.低血压 b.剧烈疼痛c.麻醉作用持久d.呼吸心跳骤停e.损伤脊髓导致截瘫  
25.门静脉高压术前护理不正确的是 ( d )

a.卧床休息 b.低脂高糖、高维生素饮食 c.限制蛋白质摄入 d.术日晨放置胃管  
e.术前晚用酸性液灌肠

) a.活动明显受限 b.后期有关节畸形 c.常对称性、多发性出现

一次咯血量 d.侵犯四肢小关节 e.常有脏器受损表现 27.在我国引起肝硬化的主要原因是 ( a )

a.病毒性肝炎 b.酒精性肝炎 c.胆管阻塞或胆汁瘀积 d.慢性充血性心力衰竭 e.药物中毒  
28.对肝性脑病病人正确的治疗措施是 ( e )

a.可用镇静药物 b.可大量放腹水 c.可食蛋白质 d.可快速利尿 e.可用弱酸溶液灌肠  
29.体重3.7kg的婴儿用牛奶喂养，每日供给含8%糖的牛奶 ( a )

a.450ml b.650ml c.700ml d.100ml e.200ml 30.提示类风湿关节炎病情活动的表现是 ( a )

a.关节晨僵 b.关节疼痛 c.关节畸形 d.关节梭形肿胀e.关节外表现

)

a、上消化道大出血 b、急性穿孔 c、慢性穿孔 d、幽门梗阻 e、癌变

d )

a、头低足高位 b、平卧位头偏向一侧 c、俯卧位 d、患侧卧位 e、半卧位

b )

a、突然发作呼吸困难 b、进行性呼吸困难 c、心悸 d、咳粉红色痰 e、咯血

( e )

a、高血压 b、蛋白尿 c、浮肿 d、管型尿 e、毒血症状

d )

a、左心功能不全 b、右心功能不全 c、支气管哮喘 d、支气管异物 e、大面积肺不张

e )

a、限制钠盐摄入 b、限制水的摄入 c、补充蛋白质 d、联合或交替使用利尿剂 e、定期放腹水

c )

a、进食后疼痛 b、疼痛较前减轻 c、疼痛规律消失 d、疼痛程度不变 e、出现大便潜血阳性

( a )

a、给予充足热量，以防止体内蛋白分解，维持氮质平衡 b、所给蛋白质以植物蛋白最好  
c、尿毒症患者蛋白质供给量应尽量减少，以免尿素氮增高 d、严格限制水、钠、钾的摄入量  
e、凡尿毒患者均不参加任何体力劳动或体育锻炼

)

a、多尿、低比重尿 b、脓尿、管型尿 c、少尿、血尿、蛋白尿、管型尿 d、尿频、尿急、脓尿  
e、以血尿为主 40、咯血病人一般不选用下列哪项药物 ( b )

a、氯化铵 b、可待因 c、必嗽平 d、咳必清 e、棕色合剂

d )

a、 pao2 bsao2 c、 cao2 d、 paco2 e、 t-co

b )

a、严格限制水分 b、多食蛋白质  
c、详细记录尿量 d、预防感染 e、每日晨查非蛋白氮、二氧化碳结合力、血清钾

( b )

a、皮肤溃疡 b、皮肤瘙痒 c、皮肤粘膜弥漫性黑色素沉着 d、皮肤、粘膜易感染  
e、皮肤粗糙，易皲裂

c )

a、快速补液 b、维持原补液速度 c、停止补液 d、减慢补液速度 e、补液速度不变，适当减量

a )

a、呼吸困难 b、紫绀 c、烦躁不安 d、皮肤潮红，多汗 e、球结膜充血

c )

a、清除细菌毒素 b、防止霉菌繁殖 c、抑制大肠杆菌生长 d、降低肠道内pH值 e

e )

a、阻塞性肺气肿 b、自发性气胸 c、支气管异物 d、支气管癌 e、支气管哮喘

d )

a、输新鲜血 b、手术结扎止血 c、使用双气囊三腔管压迫 d、应用去甲肾上腺素 e

c )

a、呼吸深快 b、明显紫绀 c、三凹征 d、鼻翼扇动 e、哮喘音

50、急性肾炎患儿，目前水肿消退，血压正常，•肉眼血尿消失。此时护士可以告诉患儿（ b )

a、应当绝对卧床 b、在室内轻微活动 c、恢复上学 d、恢复体育活动 e、适当参加劳动

c )

a、给透析液适当加温 b、减慢透析液进出速度 c、改用高渗透析液 d、让病人变换体位 e、及时治疗腹膜炎

( c )

a、6.5 ~ 6.65 b、7.35 ~ 7.4 c、7.8 ~ 9.3 d、8.15 ~ 9.43 e、9.5 ~ 11.6

a )

a、头低足高位 b、俯卧位 c、平卧位 d、侧卧位 e、头高足低位

昨起神志模糊，无抽

搐。查体：神志不清，二肺散在干湿啰音，下肢浮肿。临床考虑为肺性脑病，下列哪项可作为确诊指标？（ a )

a、动脉血氧分压 < 8.0kpa，动脉血二氧化碳分压 > 6.7kpa b、p h 值低于7.35

c、二氧化碳结合力升高 d、血氯、血钾降低 e、血钠降低

e )

a、细菌感染性肾脏疾患 b、病毒感染性肾脏疾患 c、中毒性肾脏疾患 d、出血性肾脏疾患 e、免疫性肾脏疾患

( e ) a、100 b、200 c、300 d、400 e、500

、帮助消化、禁食

d )

a、持续性高血压，尿蛋白持续阳性，眼底动脉痉挛 b、血压波动较大，头痛、头晕、心悸

c、血压急骤升高，剧烈头痛、呕吐、心动过速 d、反复尿蛋白，逐渐伴有血压持续升高

e、血压急剧升高，数周内出现氮质血症

b )

a、前庭功能紊乱 b、颅内压增高 c、幽门梗阻 d、霍乱 e、急性胃炎

d ) a、 12 b、 24 c、 36 d、 48 e、 72 60、肝性脑病最早的表现是 ( b )

a、昏睡 b、性格和行为的改变 c、定向力障碍 d、反复亢进 e、扑翼样震颤

(7天)。

) (定部位 ) (定体位 ) (定血压计 )。

) (浅度溃疡期) (坏死溃疡期)。

ab )

a.杀灭或清除媒介物上病原微生物，使其达到无害化水平的处理为消毒。

b.杀灭或清除媒介物上所有微生物的处理为灭菌。 c.抑制媒介物上的病原微生物的处理为消毒。

d.杀灭或清除媒介物上的病原微生物，使其达到无害化水平的处理为灭菌。

e.杀灭或清除媒介物上的绝大部分病原微生物的处理为灭菌。 2.下列哪些方法可以达到灭菌 ( abe )

a.热力法 b.电离辐射法 c.新洁尔灭浸泡 d.2%碘酊浸泡 e.2%戊二醛浸泡

3.受到致病性分支杆菌污染的物品消毒不应选择 ( ce )

a.高效消毒剂 b.中效消毒剂 c.低效消毒剂 d.灭菌剂 e.防腐剂 4.碘伏有以下哪些特点 ( abcde )

a.稳定性好 b.刺激性小 c.毒性较低 d.中效消毒剂 e.腐蚀性很小 5.压力蒸汽灭菌器有 ( abcde )

a.立式或卧式下排气压力蒸汽灭菌器 b.预真空压力蒸汽灭菌器

c.预真空脉动压力蒸汽灭菌器 d.快速蒸汽压力灭菌器 e.手提式压力蒸汽灭菌器

abcd )

a.紫外线空气消毒器 b.紫外线表面消毒器 c.紫外线饮水消毒器 d.紫外线消毒箱 e.紫外线消毒锅

abcde ) b.存放时间10—14天

c.放在无菌区的距地面最低的格不得小于20厘米

d.放在无菌区的距天花板最高的格不得小于50厘米

e.放在无菌区的距墙面最近不得小于或等于5厘米

bce ) a.煮沸法 b.烤箱 c.焚烧 d.压力蒸汽 e.酒精烧烤

abc ) a.硬物裸露物灭菌，在121 ，需要15分钟 b.硬物包裹，在121 ，需要20分钟

c.织物包裹，在121 ，需要30分钟 d.硬物裸露物灭菌，在132 ，需要4分钟

e.织物包裹，在132℃，需要4分钟

abcde ) a.硷性戊二醛杀菌效果好 b.硷性戊二醛化学稳定性比酸性差

c.硷性戊二醛一般使用期不得超过2周 d.戊二醛每一百毫升需要加亚硝酸钠0.5克

e.戊二醛属于高效消毒剂或灭菌剂

( × )

( )

( × )

( × )

( × )

( × )

( )

( )

( )

)

)

( )

( × )

( )

( × )

( × )

射胰岛素。( × )

)

( ) 20、吞服强酸、强碱等腐蚀性毒物患者，应立即洗胃。( × )

答：三查是指操作前、操作中、操作后查对；

七对是指查对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间和用法；

一注意是指注意观察用药反应。

答：常见的输液反应有：(1)发热反应

(2)静脉炎及血栓性静脉炎

(3)循环负荷过重 (4) 空气栓塞

答：将听诊器放于病人胃部，快速经胃管向胃内注入10ml空气，听气过水声。

在胃管末端连接注射器抽吸，能抽出胃液。

将胃管末端放于盛水的治疗碗中，无气泡溢出。

答：保留灌肠时应注意以下事项：

(1) 在保留灌肠前，对灌肠的目的和病变部位了解清楚，以便掌握灌肠时的卧位及插入肛管的深度。

(2) 灌肠前嘱患者先排便。肛管要细，插入要深，液量要少，压力要低，使灌入的药物能保留较长的时间，以便充分吸收。

(3) 肛门、直肠、结肠手术后的患者及大便失禁的患者不宜保留灌肠

答：并发症有上消化道出血、感染、肝性脑病、原发性肝癌、电解质和碳酸碱平衡紊乱、肝肾综合征等。

答：正常人唾液中含有溶菌酶，具有杀菌作用，高热时病人的口腔唾液分泌减少，舌、口腔粘膜干燥，口腔内食物残渣发酵均有利于细菌繁殖而引起舌炎、牙龈炎，可致口臭，影响食欲及消化功能，因此高热病人需做好口腔护理，保持口腔清洁，预防并发症的发生。

2.增加循环血量,改善微循环,维持血压及微循环灌注量

3.供给营养物质,促进组织修复,增加体重,维持正氮平衡 4.输入药物,治疗疾病.

## 护理三基三严700道题库篇四

### 医院“三基三严”培训考核整改措施

认真抓好医学临床"三基"培训,对提高医务人员水平和整体素质具有十分重要的意义,是加强医院内涵建设的一个重要环节,同时也是医院管理年活动的要求。

医学"三基"是指基本理论、基础知识和基本技能;"三严"是指严格要求、严谨态度、严肃作风。"三基"培训应遵循以下几项原则:层次性原则、实用性原则、加强基本功训

练原则、更新知识原则和理论与临床实践相结合的原则。

我院为了加强对医务人员"三基"培训,特制定以下措施。

医院各级各类医疗、医技人员。

医务人员经过规范化培训,要达到卫生部《卫生技术人员职务试行条例》规定的水平。

(一)授课形式

(二)个人自学 临床医生有计划地熟读《病历书写基本规范》、《核心制度》,《医学临床、医技"三基"训练》和各种疾病诊疗常规。(三)

教学

查房、疑难病例讨论形式。

理论、基础知识考试;实践技能操作比赛;住院医师"三基"理论知识考试。病历书写规范培训;住院医师相关知识培训。有关法律法规、规章制度、职责。

(一)考核目的 熟练掌握基本理论、基础知识和基本技能,医师能规范地书写病历。(二)考核类型

录考试成绩。

"三基"实践操作 1 7 1 7 1 7赛。

操作的考试。

医务人员考试成绩记入本人档案。考试成绩优秀者,按医院有关规定进行奖励,并作为职称晋升,培养选拔使用任职资格的重要依据;对成绩不合格者,安排补考,限期达到标准。凡经第二次补考不合格者,卫生技术人员要被调整工作岗位。

护理三基三严700道题库篇五

护理三基考试试卷

(2016年01月份)

姓名

分数

(单项选择题,每题一分,共100分)

( b

)

- a、休克
- b、心前区疼痛
- c、心律失常
- d、充血性心力衰竭
- e、胃肠道症状

( b

)

- a、肛裂
- b、心搏骤停
- c、直肠曲张
- d、便血
- e、血压升高

( c )

- a、心源性休克
- b、心力衰竭
- c、严重心律失常
- d、电解质紊乱
- e、发热

( c )

- a、支气管扩张
- b、慢性支气管炎
- c、肺结核

d、支气管肺癌

e、风湿性心脏病二尖瓣狭窄

( a )

a、解除呼吸道梗阻

b、加压给氧

c、使用呼吸兴奋药

d、输血

e、口对口人工呼吸

( b )

a、12小时

b、24小时

c、48小时

d、72小时

e、96小时

( b )

a、准备急救用品和药物

b、建立静脉输液途径

c、去枕平卧头偏一侧 d、迅速配血备用

e、按医嘱应用止血药

( c )

a、喉头水肿

b、牵引过紧

c、胃气囊阻塞咽喉

d、血液反流至气管

e、食管气囊充气过多

( c )

a、注意出血

b、高热处理

c、预防感染

d、观察病情变化

e、记录药物反应

( b )

a、恶性贫血

b、缺铁性贫血

c、再生障碍性贫血

d、溶血性贫血

e、地中海贫血

( c )

a、毛细血管脆性试验阳性

b、紫癜呈对称性分布

c、血小板正常

d、下肢皮肤有紫癜

e、有过敏史

( a )

a、周围神经病变

b、神经根病变

c、自主神经病变

d、脊髓病变

e、脑神经病变

( c )

a、神志改变

b、多饮多尿症状明显 c、局限性抽搐 d、血压偏低

e、食欲减退

( b )

a、原发性高血压

b、慢性肾小球肾炎

c、慢性肾盂肾炎

d、肾动脉硬化

e、红斑狼疮性肾炎

( c )

a、肾功能减退

b、出血性膀胱炎

c、大量蛋白尿

d、高血压

e、尿中纤维蛋白降解产物增加

( d )

a、输入小苏打

b、输入钙剂

c、输入高渗葡萄糖加胰岛素

d、血液透析

e、口服钠型阳离子交换树脂

( c )

a、眼眶及前囟凹陷

b、精神萎靡、烦躁不安

c、出现休克症状

1 d、哭时少泪及尿量减少

e、口唇黏膜干燥，皮肤苍白

(

a )

a、 10%

b、 15% c、 20%

d、 25%

e、 30%

(

c )

a、 食欲减退

b、 精神萎靡

c、 进行性消瘦

d、 面色苍白

e、 肌肉松弛 20、 . 抢救新生儿窒息的首要措施是 ( a )

a . 清理呼吸道 b . 人工呼吸 c . 给呼吸中枢兴奋剂 d . 加压给氧 e . 给予碳酸氢钠纠正酸中毒

21 . 头罩法给氧时，每分钟氧流量为？

(

e

) a . 1 ~ 3l ;

b . 2 ~ 5l ;

c . 3 ~ 6l ;

d . 4 ~ 7l ;

e . 5 ~ 8l。

22 . 对于惊厥发作患儿的处理下列哪项不妥？

(

a) a . 立即送抢救室；

b . 将舌轻轻向外牵拉；

c . 平卧头侧位，松解衣领；

d . 放纱布在患儿手中和腋下；

e . 将牙垫置于上下磨牙间。

23 . 小儿使用热水袋的温度不宜超过多少摄氏度？

(

d) a . 40 ; b . 45 ; c . 55 ; d . 60 ; e . 65 。

24 . 新生儿适宜的室温是？

(

d) a . 16 ~ 18 ;

b . 18 ~ 20 ;

c . 20 ~ 22 ;

d . 22 ~ 24 ;

e . 24 。

(

- c) a.20~24 ;
- b.26~28 ;
- c.28~32 ;
- d.34~36 ;
- e.38~42 。

(

- b) a.吸氧
- b.保暖.饮热水
- c.补液
- d.肌内注射地塞米松
- e.静脉点滴氢化可的松。

(

- c) a.呕吐物为胃内容物
- b.呕吐物为胆汁
- c.喷射性呕吐
- d.频繁地呕吐
- e.反射性呕吐

28 . 床上擦浴适宜的水温是

(

d )

- a . 32 ~ 34    b . 36 ~ 40
- c . 41—45t

d . 47 ~ 50

e . 55 ~ 60 29 . 成人通过胃管鼻饲喂食时 , 其胃管插入的深度为

(

d )

a . 15~ 25 cm

b . 25~ 35 cm

c . 35~ 45 cm

d . 45~ 55 cm

e . 55~ 65 cm 30 . 膀胱高度膨胀又极度虚弱的患者 , 首次导尿量不得超过

(

c )

a .

100 ml

b . 500 ml

c .

1000 ml

d . 2000 ml

e .

3000ml 31 . 患者李某 , 进行青霉素皮肤试验5分钟后突然晕倒在地 , 面色苍白 , 呼吸微弱 , 脉搏细弱 , 意识丧失。护士首先应

(

e )

a.立即通知医师

b . 立即给予氧气吸入

- c . 立即肌内注射洛贝林
- d . 立即皮下注射异丙肾上腺素
- e . 立即皮下注射盐酸肾上腺素

(

- b )
- a . 10 ~ 12个月
- b . 12 ~ 18个月
- c . 18 ~ 20个月
- d . 2岁
- e . 2岁半

(

- a )
- a . 保暖
- b . 加强喂养
- c . 预防感染
- d . 加强脐部护理
- e . 加强臀部护理

(

- d )
- a . 重度贫血
- b . 低血钠
- c . 低血钾
- d . 低血糖

e. 继发感染

( c )

- a、手术治疗
- b、抗生素治疗
- c、排气减压
- d、胸带固定
- e、镇静止痛

( d )

- a、平卧位
- b、头高脚低位
- c、半卧位
- d、俯卧位
- e、侧卧位

( a )

- a、清除呼吸道内的堵塞物
- b、建立静脉通道
- c、应用抗生素

2 d、预防脑水肿

e、立即口对口人工呼吸

( a )

- a、胰蛋白酶局部注射或套封
- b、拔除毒牙
- c、伤口近心端肢体结扎

d、局部伤口烧灼

e、局部外敷中草药

( c )

a、仰卧位

b、俯卧位

c、俯卧头低脚高位

d、平卧位

e、头高脚低位

( a )

a、迅速脱离中毒现场

b、静脉滴注 a t p、辅酶 a 等

c、预防脑水肿

d、吸氧、纠正缺氧

e、休克时纠正休克

( a )

a、切断电源

b、胸外心脏按压

c、包扎创面

d、注射 t a t

e、预防感染

( c )

a、心房颤动

b、心房扑动

- c、心室颤动
- d、阵发性室上性心动过速
- e、频发性室性期前收缩

43急性心肌梗死病人第一周必须

( a )

- a、绝对卧床
- b、床上四肢活动
- c、由人搀扶室内行走
- d、日常生活自行料理
- e、开始功能锻炼

( d )

- a、急性肺炎
- b、慢性阻塞性肺气肿
- c、自发性气胸
- d、严重贫血
- e、右心衰

( b )

- a、胃液
- b、胰液
- c、肠液
- d、唾液
- e、胆汁

( e )

- a、门静脉内压增高
- b、血清白蛋白减少
- c、肾小球滤过减少
- d、醛固酮分泌增多
- e、脾功能亢进

( c )

- a、低钙血症
- b、低钠血症
- c、高钾血症
- d、低钙血症
- e、高镁血症

(

a )

- a通过静脉输入全部营养
- b从胃管内补充营养的不足
- c少量口服
- d补充要素膳食
- e添加匀浆液

(

b )

- a感觉异常
- b疼痛
- c苍白

d 发绀

e 体温下降 50、禁忌使用鼻饲法的患者是

(

e )

a 口腔手术后

b 破伤风患者

c 昏迷患者

d 人工冬眠患者

e 食管静脉曲张出血者

( a

)

a.脉率 < 心率

b.脉率 > 心率

c.脉率 = 心率

d.脉率大于100次/分

e.脉率小于60次/分

(

b )

a.高蛋白、低盐饮食

b.低脂肪、适量蛋白饮食

c.禁食

d.暂停蛋白质饮食

e.高蛋白适量脂肪饮食

( d )

- a.赶快请医生
- b.抽血检查血型，重作交叉配合
- c.静注异丙嗪25mg
- d.立即停止输血
- e.留尿检查血尿

此时应预防的主要并发症是

( d )

- a.皮肤水疱、糜烂
- b.血管、神经损伤
- c.关节僵硬
- d.坠积性肺炎、褥疮
- e.缺血性骨坏死

24h尿量少于

( b )

- a.500 ml
- b.400 ml
- c.300 ml
- d.200 ml
- e.100 ml

3

( d

)

a.低钠血症

b.低钾血症

c.高钠血症

d.高钾血症

e.低镁血症

(

e

)

a、询问病人不适主诉

b、给药前先数心率

c、观察洋地黄药物浓度

d、心率 < 60次/min，不能给药

e、嘱病人如果一次漏服，下一次加量补服

( e

)

a、心悸、呕吐

b、咳嗽、气促、呼吸困难

c、发绀、躁动不安

d、胸闷、心悸、气促

e、咳嗽、咳粉红色泡沫痰、气促、胸闷

(

a

)

- a、头部胀痛、面部潮红、腰背部剧痛
- b、寒战、高热
- c、少尿
- d、瘙痒、皮疹
- e、呼吸急促、血压下降 60、为患者实施头部降温的主要目的。

(

d )

- a局部消肿
  - b减轻疼痛
  - c限制炎症扩散
  - d防止脑水肿
- 减轻充血和出血， 6

( d

)

- a.颈静脉充盈情况
- b.面色和肢端温度
- c.血压和脉搏
- d.尿量和中心静脉压
- e.根据已丧失量

( d

)

- a.急性阑尾炎穿孔
- b.胆囊炎穿孔
- c.急性胰腺炎
- d.溃疡病穿孔
- e.急性肠梗阻 6

( d

)

- a.快速静脉注射
- b.一次剂量在2小时内滴完
- c.一次剂量在1小时内滴完
- d.一次剂量在15分钟内滴完
- e.滴注速度与疗效无关 6

( e )

- a.多饮水
- b.粗细粮搭配食用
- c.低盐
- d.低胆固醇膳食
- e.高热能高维生素膳食

( c )

- a.减少热量摄入
- b.减少脂肪摄入
- c.限盐

d.多吃鱼和大豆

e.多摄食钾、镁、碘、锌含量高的食物

( c )

a.出血量多少

b.出血呈鲜红色

c.血中含有气泡和痰

d.呈碱性反应

e.有高血压性心脏病史

( d )

a.观察伤口

b.清洁伤口

c.去除坏死组织

d.止痛

e.置放引流物

( b )

a.急性胆囊炎

b.急性梗阻性化脓性胆管炎

c.胆总管结石

d.胆道蛔虫症

e.胆囊结石急性发作

( d )

a.咳嗽

b.咳粉红色泡沫状痰

c.浮肿

d.呼吸困难

e.腹胀

( b )

a.24小时平均分配输入

b.先快后慢

c.先慢后快

d.在12小时内输完

e.8小时内输完

( c )

a.进食后疼痛

b.疼痛较前减轻

c.疼痛规律消失

4 d.疼痛程度不变

e.出现大便潜血阳性

( c )

a.密切观察意识、瞳孔变化

b.抬高床头15-30厘米

c.躁动时酌情使用少量吗啡

d.便秘严重者用甘油低压灌肠

e.保持呼吸道通畅，必要时气管切开

( c )

a.纠正高血钾

b.纠正酸中毒

c.庆大霉素控制感染

d.纠正水电解质失衡

e.记出入量 7

( d )

a、软食

b、冷流食

c、普食

d、暂禁食

e、半量流质

a、饮量突然减少

b、暖气反酸加重

c、恶心、腹胀明显

d、上腹居剧痛、腹肌紧张

e、常发生“午夜痛” 7

a、阿托品

b、西米替丁

c、灭吐灵

d、胃肠减压

e、吗啡

a、腹肌紧张、腹痛和腹部压痛

b、腹肌紧张、腹部压痛和反跳痛

c、腹反跳痛、腹痛和腹部压痛

- d、腹肌紧张、腹痛和休克
- e、腹肌紧张、休克和腹部压痛
- a、进食 - 缓解
- b、进食 - 疼痛
- c、疼痛 - 进食 - 缓解
- d、进食 - 缓解 - 疼痛
- e、进食 - 疼痛 - 缓解
- a、发热
- b、出血
- c、血糖降低
- d、贫血
- e、器官浸润
- a、心血管并发症
- b、糖尿病酮症酸中毒昏迷
- c、神经病变 d、高渗性非酮症糖尿病昏迷
- e、感染
- a、体重下降
- b、易激动
- c、多食善饥
- d、月经量增多
- e、疲乏无力
- a、水不宜摄入过多
- b、无须补钾

- c、限制钠盐
- d、正确记录出入水量
- e、根据需要测定电解质
- a、颈静脉充盈或怒张
- b、肝脏肿大和压痛
- c、周围型发绀
- d、咳粉红色泡沫痰
- e、下垂性凹陷性水肿
- a . 立即给予氧气吸入
- b . 将病人半卧位协助咳嗽排痰
- c . 立即肌肉注射吗啡10mg 镇静
- d . 立即用鼻导管吸痰 8
- a . 肾功能 ; b . 心功能 ; c . 肝功能 ; d . 肺功能 ; e . 脑功能。 8
- a . 呼吸困难、发绀
- b . 胸闷气促、烦躁不安
- c . 心悸、恶心、呕吐
- d )
- e )
- b )
- e )
- c )
- a )
- d )

b )

d )

(

b

)

(

a

)

d

)

( ( ( ( ( (

(

( (

( d . 呼吸困难、咳嗽、胸闷、咳粉红色泡沫痰

e . 寒战、高热、呼吸困难 8

(

a

)

a . 减少静脉回心血量，减轻肺淤血和心脏负担

b . 使膈肌下降，减轻对心脏的压迫 c . 扩大胸腔容量，增加肺活量

d . 扩张冠状动脉，改善心肌血液循环

e . 患者舒适，有利于休息

(

b

) a.急性肺水肿

b.空气栓塞

c.超敏反应

d.发热反应

e.溶血反应 8

(

d

) a.浓集红细胞

b.红细胞悬液

c.洗涤红细胞d.血浆

e.全血 90、一患者吸氧的流量为4l/min，其吸氧的浓度是

(

b

) a.40%

b.37%

c.33%

d.27%

e.25% 9

( a )

a、调整膳食中糖的供给量

b、减轻胰岛细胞的负担

c、纠正糖代谢紊乱

d、降低血糖

e、控制体重

( b )

a、高血压病

b、慢性肾小球肾炎 c、慢性肾盂肾炎 d、肾动脉硬化 e、红斑狼疮性肾炎 9

( c )

a、肾功能减退

b、出血性膀胱炎

c、大量蛋白尿

d、高血压

e、尿中纤维蛋白降解产物增加

( a )

a、 30% - 35%

b、 50%

c、 50%

d、 35% - 40%

e、纯氧

( d )

a、腹泻

b、腹痛

c、便秘

d、主要是结核病的全身毒血症状

e、便血

( d )

- a、戒烟6小时
- b、禁食10小时
- c、禁半流质8小时
- d、戒烟、禁食、禁药12小时
- e、禁药11小时

( b )

- a、增加体重
- b、减轻肝脏负担各损害
- c、延缓门静脉血栓形成
- d、避免食管静脉破裂
- e、减少并发肺部感染机会

( b )

- a、肝细胞再生
- b、肝细胞变性坏死
- c、炎症细胞浸润
- d、肝实质细胞蛋白合成功能障碍
- e、结缔组织增生

( e )

- a、安置病人半卧位
- b、给予低盐饮食
- c、定期测量腹围和体重
- d、准确记录每天出入水量

e、经常给予冷敷 100、下列哪项不是高血压危象的常见表现

( e )

a、血压显著升高

b、心力衰竭

c、脑血管痉挛

d、心绞痛

e、呕吐和神志改变

更多 范文大全 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发