

# 桂花树几月开花

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/2692.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

桂花树几月开花

总结精选（1）：

一般桂花是在几月开花

不同品种的桂花开花时间不一样，而且开的花色彩也不一样，下面我们来看一看不同品种的桂花的花期吧！

1、银桂：花期9~10月，色彩白色或黄白色。

银桂品种群：常绿性小乔木，树冠圆球形，大枝开展，枝叶稠密，长势良好。树皮浅灰色，皮孔多且大，形似雪花，十分明显。春梢平均长度为15.5cm，新梢褐红色，十分醒目。叶片绿色或深绿色，厚革质，有光泽；长椭圆或椭圆形；叶片较宽阔且厚实；叶面较平展；叶缘浅波状、反卷、全缘、偶先端有疏齿；开花在9月上中旬，花冠斜展，裂片卵圆形，花色乳黄至柠檬黄，香气浓郁；花后不结实。

秋季开花，花色纯白、乳白、黄白色或淡黄色。品种有宽叶籽银桂、柳叶银桂、硬叶银桂、“籽银桂”、“九龙桂”、“早银桂”、“晚银桂”、“白洁”“纯白银桂”、“青山银桂”等品种。

2、金桂：花期9~10月，色彩金黄色。

金桂品种群：常绿性小乔木，树冠圆球形；树势强健，枝条挺拔，十分紧密。树皮灰色，皮孔圆或椭圆形，春梢比较粗壮，长度平均15.9厘米；叶色深绿，革质，富有光泽；叶片椭圆形，叶面不平整，叶缘微波曲，反卷明显；全缘，偶先端有锯齿；花色黄，有浓香，不结实。

秋季开花，花柠檬黄淡至金黄色。品种有“大花金桂”、大叶黄”、“潢川金桂”、“晚金桂”、“圆叶金桂”、咸宁晚桂、球桂、圆瓣金桂、柳叶苏桂、金师桂、波叶金桂、等品种。

3、丹桂：花期10月份，色彩橙红色或橙黄色。

丹桂品种群：一种常绿灌木，雌雄异株，树冠圆球形。树皮浅灰色，较平滑，皮孔稀疏。叶革质，长椭圆形或椭圆形，长6-12厘米，宽2.5-5厘米；叶面较平整，叶缘反卷，全缘，先端偶有疏齿，基部宽楔形；先端钝尖或短尖；侧脉8-10对，网脉两面明显；叶柄长8-10毫米。花色橙红，花冠稍内扣；香味淡。花期9月下旬至10月上旬。秋季开花，花色较深，橙黄、橙红至朱红色，气味浓郁，叶片厚，有“大花丹桂”、“齿丹桂”、“朱砂丹桂”、“宽叶红”等品种。

4、四季桂：每月皆有少量的花，色彩为白色。

另外桂花根据种植区域的不同也会导致开花的时间略有差异。上海安徽江苏那基本是10月开，东北那一带基本8月就开了，北京天津河北一带是9月，四川广西陕西一带是9月开。

注意：桂花不到开花的年龄是不会开花的。桂花寿命长，一般可活几十年到几百年，有的甚至活到千年，所以它的开花年龄也比较晚。播种的实生苗要十年左右开花，扦插的要四年开花，嫁接的金桂银桂到次年有五分之一开花，嫁接的四季桂虽然当年开花但为数很少。

移栽的大桂花树有的当年就能开花，有的要适应一、两年才开花。

最后总结各种桂花的开花时间：

- 1.银桂；花期9~10月，色彩白色或黄白色。
- 2.金桂；花期9~10月，色彩金黄色。
- 3.丹桂；花期10月份，色彩橙红色或橙黄色。
- 4.四季桂；每月皆有少量的花，色彩为白色。

总结精选（2）：

习惯上将桂花分成以下四个品种类型：四季桂、银桂、金桂和丹桂。

1.四季桂：

常绿灌木，花黄白色或淡白色，一年开花数次，但仍以秋季为主。植株较小，以灌木为主，叶片较其他品种薄。成为桂花家族中一名后起之秀。它打破一般桂花品种一年只开花一次的常规，每年可分别于2月、5月、8月和11月绽花4次，通常每季花期约有20多天。所开的花儿密集，花色黄白，在枝条中分布均匀，花香也较为持久。气味馥郁，令人感觉良好，可供作泡茶和糕饼的香料用。

2.银桂：

花朵色彩较白，稍带微黄，叶片较薄。银桂品种群：秋季开花，花色纯白、乳白、黄白色，有“籽银桂”，“九龙桂”、“早银桂”、“晚银桂”、“白洁”等品种。

3.金桂：

桂花的一个品种，也是观赏价值、经济价值和实用价值三者都很高的桂花品种。金桂花朵金黄，花香馥郁，叶片浓绿，在众多桂花中观赏价值最高，古代即盛行栽培，而今已推广到全国各地。金桂是常绿性小乔木，树冠圆球形；树势强健，枝条挺拔，十分紧密。树皮灰色，皮孔圆或椭圆形，数量中等，有浓香，不结实，花金黄色，香味浓，开花量多，每年秋季开花。金桂树形好、长势好，花色、花香和花量又全面胜人一筹，从而成为我国南方各地园林竞相引种栽培，个性是用作观赏栽培。

4.丹桂

大型灌木，中叶类，早芽种。植株较高大，树姿半开张，分枝较密。叶形椭圆，叶尖渐尖，叶身内卷。春芽萌发期一般在3月上旬，一芽三叶期在4月上旬。生长势旺盛，育芽潜力强，芽叶尚肥壮，嫩梢芽叶稍黄绿，茸毛少。开花量与结实量中等。抗寒、抗旱潜力强，雌雄异株，叶长椭圆形，开橘红色花，香味很浓，是珍贵的观赏植物。

不同品种的桂花开花时间不一样，而且开的花色彩也不一样，通常金桂花期9~10月，色彩金黄色，银桂花期9~10月，色彩白色或黄白色，丹桂花期为10月份，色彩橙红色或橙黄色，四季桂除了天气温度较高时，每月皆有少量的花，色彩为白色。

早花朱砂8月13日零星小花

经过多年的观察，每次桂花盛花前的半个月，极个别的桂花树上会有零星的几朵小花，意味着花期的临近，往往不出半个月便会盛开，桂花的花期与气候环境影响较大，有时立秋后频繁下雨、冷空气的来临后湿度大，早晚温差很大致使桂花的花期偏离，有时可能离中秋节还有一个月就提早绽开了笑脸，有时秋后气温持续高温，则延缓桂花花

期。

秋天日香桂较其他品种的初花期要早些

按照前几日某些零星开放的桂花来决定的话，今年的花期将会和以往传统花期相差无几，在8月底9月初，中秋佳节时正值桂花怒放，节假日到花园赏桂花别有一番乐趣。

总结精选（3）：

#### 一、四季桂

四季桂是在每年的9月至次年的3月份才分批开花的。这类品种的桂花它丛生灌木状，树形比较低矮，而分枝短密，树冠呈圆球形。它的新叶为深红色，老叶则为绿色或黄绿色。花色比较淡，花香不及银桂、金桂、丹桂品种的浓郁。

#### 二、丹桂

丹桂的开花时间在每年的9月下旬到10月上旬，它是一种常绿灌木，树皮是浅灰色，较平滑；而树冠也是呈圆球形，长6-12厘米，宽2.5-5厘米；叶面较平整，叶柄长8-10毫米。花色是橙红色，花冠稍内扣，气味比较浓郁。

#### 三、金桂

金桂的开花时间是在每年的9-10月上旬，是一种常绿性的小乔木，树冠也是圆球形；树势强健，枝条比较挺拔，长度平均在15.9厘米；它的花色为黄色，在秋季开花而花为柠檬黄淡至金黄色，香味也比较浓郁。

#### 四、银桂

银桂的开花时间是在每年的9月上旬，也是一种常绿行小灌木，树冠圆球形，枝叶开展稠密；树皮呈浅灰色，皮孔大且多，有点形似雪花的样貌。而且这种品种的桂花它的花香也比较浓郁，但是花开过后就比较不结实。

#### 五、其他

另外，桂花有的时候还会因种植区域的不同，而导致开花的时间也略有差异。比如：在上海、安徽或江苏那一带基本是10月份才开花，而在东北那一带基本上在8月份就开了，在北京、天津、河北一带则在9月份才开花等等都是不一样的。总而言之，桂花它不到开花的年龄是必须不会开花的。

小结：以上就是对不同品种的桂花是几月开花之时间的介绍，其实桂花给予人们的感受还是十分好的，尤其是它的花香，每逢丹桂飘香的时节，总令许多人向往前去观赏。因为盛开的桂花树定能散发出淡淡的清香，闻过之后令人神清气爽。因此，了解过不同品种的桂花它的开花时间后，就能在适宜的时间前去观赏。

#### 【相关阅读】

#### 桂花介绍

桂花为中国木犀属众多树木的习称，它有名为岩桂，它的质坚皮薄，叶长椭圆形面端尖，对生，经冬不凋。花生叶腋间，花冠合瓣四裂，形小，其园艺品种繁多，最具代表性的有金桂、银桂、丹桂、月桂等。桂花是我国的十大花卉之一，是集绿化、美化、香化于一体的观赏与实用兼备的优良园林树种，桂花清可绝尘，浓能远溢，堪称一绝。

桂花是常绿乔木或灌木，高3-5米，最高可达18米；树皮灰褐色。小枝黄褐色，无毛。叶片革质，椭圆形、长椭圆形或椭圆状披针形，长7-14.5厘米，宽2.6-4.5厘米，先端渐尖，基部渐狭呈楔形或宽楔形，全缘或通常上半部具细锯齿，两面无毛，腺点在两面连成小水泡状突起，中脉在上面凹入，下面凸起，侧脉6-8对，多达10对，在上面凹入，下面凸起；叶柄长0.8-1.2厘米，最长可达15厘米，无毛。聚伞花序簇生于叶腋，或近于帚状，每腋内有花多朵；苞片宽卵形，质厚，长2-4毫米，具小尖头，无毛；花梗细弱，长4-10毫米，无毛；花极芳香；花萼长约1毫米，裂片稍不整齐；花冠黄白色、淡黄色、黄色或桔红色，长3-4毫米，花冠管仅长0.5-1毫米；雄蕊着生于花冠管中部，花丝极短，长约0.5毫米，花药长约1毫米，药隔在花药先端稍延伸呈不明显的小尖头；雌蕊长约1.5毫米，花柱长约0.5毫米

。果歪斜，椭圆形，长1-1.5厘米，呈紫黑色。花期9-10月上旬，果期翌年3月。

有生长势强、枝干粗壮、叶形较大、叶表粗糙、叶色墨绿、花色橙红的丹桂；有长势中等、叶表光滑、叶缘具锯齿、花呈乳白色的银桂，且花朵茂密、香味甜郁；生长势较强、叶表光滑、叶缘稀疏锯齿或全缘、花呈淡黄色、花朵稀疏、淡香，除秋季9-10月与上列品种同时开花外，还可每2个月或3个月又开一次的四季桂。丹桂和四季桂，果实为紫黑色核果，俗称桂子。桂花实生苗有明显的主根，根系发达深长。幼根浅黄褐色，老根黄褐色。

## 桂花的分布

园林桂花原产中国西南喜马拉雅山东段，印度，尼泊尔，柬埔寨也有分布。中国西南部、四川、陕南、云南、广西、广东、湖南、湖北、江西、安徽、河南等地，均有野生桂花生长，现广泛栽种于淮河流域及以南地区，其适生区北可抵黄河下游，南可至两广、海南等地。

生长地区水热条件好，降水量适宜，土壤多为黄棕壤或黄褐土，植被则以亚热带阔叶林类型为主。在上述条件的孕育和影响下，桂花生长良好，并构成了安徽六安、湖北咸宁、湖南桃源、江苏苏州、广西桂林、湖北武汉、浙江杭州和四川成都几大全国有名的桂花商品生产基地。

桂花适应于亚热带气候地区。性喜温暖，湿润。种植地区平均气温14-28℃，7月平均气温24-28℃，1月平均气温0℃以上，能耐最低气温-13℃，最适生长气温是15-28℃。湿度对桂花生长发育极为重要，要求年平均湿度75%-85%，年降水量1000毫米左右，个性是幼龄期和成年树开花时需要水分较多，若遇到干旱会影响开花，强日照和荫蔽对其生长不利，一般要求每一天6-8小时光照。

桂花喜温暖，抗逆性强，既耐高温，也较耐寒。因此在中国秦岭、淮河以南的地区均可露地越冬。桂花较喜阳光，亦能耐阴，在全光照下其枝叶生长茂盛，开花繁密，在阴处生长枝叶稀疏、花稀少。若在北方室内盆栽尤需注意有充足光照，以利于生长和花芽的构成。桂花性好湿润，切忌积水，但也有必须的耐干旱潜力。桂花对土壤的要求不太严，除碱性土和低洼地或过于粘重、排水不畅的土壤外，一般均可生长，但以土层深厚、疏松肥沃、排水良好的微酸性砂质壤土最为适宜。桂花对氯气、二氧化硫、氟化氢等有害气体都有必须的抗性，还有较强的吸滞粉尘的潜力，常被用于城市及工矿区。

桂花适宜栽植在通风透光的地方；喜欢洁净通风的环境，不耐烟尘危害，受害后往往不能开花；畏淹涝积水，若遇涝渍危害，则根系发黑腐烂，叶片先是叶尖焦枯，随后全叶枯黄脱落，进而导致全株死亡；不很耐寒，但相对其它常绿阔叶树种，还是一个比较耐寒的树种。

## 四季桂花品种

四季桂花在每年9月至次年3月分批开花。它是丛生灌木状，树形比较低矮，分枝短密，树冠圆球形。它的新叶为深红色，老叶为绿色或者黄绿色。花色较淡，为乳黄色至柠檬黄色，花香不及银桂、金桂、丹桂浓郁，品种有大叶四季桂、小叶四季桂。四季开花，有“月月桂”、“日香桂”、“大叶佛顶珠”、“齿叶四季桂”等品种。

## 桂花开花季节介绍

桂花经过长期的种植，已经发展处32个品种，它以花色而言，有金桂、银桂、丹桂之分。以叶型而言，有柳叶桂、金扇桂、滴水黄、葵花叶、柴柄黄之分。以花期而言，有八月桂、四季桂、月月佳之分。此刻的桂花品种的开花时间都已有不同的。一般的桂花开花时间在每年的9-9-10月上旬。

## 种植方法

应选在春季或秋季，尤以阴天或雨天栽植最好。选在通风、排水良好且温暖的地方，光照充足或半阴环境均可。移栽要打好土球，以确保成活率。栽植土要求偏酸性，忌碱土。盆栽桂花盆土的配比是腐叶土2份、园土3份、沙土3份、腐熟的饼肥2份，将其混合均匀，然后上盆或换盆，可于春季萌芽前进行。

## 光照温度

在黄河流域以南地区可露地栽培越冬。盆栽应冬季搬入室内，置于阳光充足处，使其充分理解直射阳光，室温持续5℃以上，但不可超过10℃。翌年4月萌芽后移至室外，先放在背风向阳处养护，待稳定生长后再逐渐移至通风向阳

或半阴的环境，然后进行正常管理。生长期光照不足，影响花芽分化。

### 浇水施肥

地栽前，树穴内应先掺入草本灰及有机肥料，栽后浇1次透水。新枝发出前持续土壤湿润，切勿浇肥水。一般春季施1次氮肥，夏季施1次磷、钾肥，使花繁叶茂，入冬前施1次越冬有机肥，以腐熟的饼肥、厩肥为主。忌浓肥，尤其忌入粪尿。盆栽桂花在北方冬季应入低温温室，在室内注意通风透光，少浇水。4月出房后，可适当增加水量，生长旺季可浇适量的淡肥水，花开季节肥水可略浓些。

### 整形修剪

因树而定，根据树姿将大框架定好，将其他萌蘖条、过密枝、徒长枝、交叉枝、病弱枝去除，使通风透光。对树势上强下弱者，可将上部枝条短截1/3，使整体树势强健，同时在修剪口涂抹愈伤防腐膜保护伤口。

一、除萌、抹芽：除萌和抹芽是在新芽刚刚萌发或新梢刚刚开始抽生的早期，新梢尚未木质化之前将它们抹除的一种方法。这一工作进行得及时，能够节省许多有机养分，促使保留枝条的快速健康发展。除萌抹芽的重点在幼树近地面的根颈部位，一年要进行多次，个性在春、夏、秋梢旺发前要及时进行。这些从不定芽、潜伏芽萌发的新梢，生命力强，抽生速度快，处理时间稍有耽误，基部就会出现许多丛生枝。更有甚者，有些徒长枝径直向上，与主干平行竞争，扰乱原有树形。由于种种原因除萌抹芽未能及时进行，萌蘖已经长成，修剪时就应从基部彻底清除，不留活桩，否则，萌蘖越剪越多。

嫁接后（枝接或芽接剪砧后）的除萌抹芽个性重要。由于接穗和砧木的愈合需要一个过程，往往是接穗尚未萌发，砧木上的隐芽便萌动抽生，与接穗争夺养分，降低嫁接成活率。即使嫁接成活，接穗抽生了新枝，萌蘖的生长势还是强于接穗，处理不及时，就会严重影响接穗新梢的生长。所以嫁接以后的除萌抹芽要多次反复进行。

二、摘心、扭梢：摘心和扭梢主要针对正在迅速生长的新梢进行。摘除新梢先端的幼嫩部分，能够控制新梢生长高度，促进枝条老熟，刺激侧枝的分生。扭梢是将半木质化的新梢扭伤，透过损伤木质部的输导组织，削弱该枝条的生长势，并保留该枝条叶片的光合功能。摘心和扭梢用于新梢生长势的调控。桂花苗木基部分枝多，主干不明显的时候，选留一个位置着生好，生长相比较较强的新梢，保留不予处理，对所有其他嫩枝进行摘心或扭梢，则保留的新梢由于顶端优势得到加强，营养集中，高度迅速增加。如此反复操作2-3次，能够培养出粗壮的主干。主干生长过于迅速，会出现太长太细或者出现竞争枝时都能够透过摘心进行调节。

三、短截、回缩和疏删：小桂花苗生长老熟的枝条需要借助整枝剪进行修剪。短截又称短剪，是将一年生的枝条剪去一部分，以减少该枝条上芽的数量，集中养分，促进枝条的增粗和分枝，刺激剪口芽抽生强枝。短截修剪多用于主枝延长枝的修剪。短截时就应注意选取剪口芽的饱满程度和芽位方向，通常选取发育饱满的芽作剪口芽，以抽生强的延长枝。如果短截的枝本身生长太旺，春梢、夏梢和秋梢连续生长，单枝延伸过长，也可利用盲节的潜伏芽留作剪口芽，以促进枝条中下部分枝。芽位的选取主要是调节枝条的延伸方向。短截的轻重程度根据枝条的粗度和期望到达的修剪反应刺激强度而定。对桂花来说，枝条的“前端节间密，容易构成轮生枝，所以主枝延长枝的修剪，一般剪去枝条的1/3，以避免轮生枝的出现。

回缩是对二年生以上的老枝进行重短截的一种修剪方式。回缩修剪主要用于骨干枝的换头，改变大枝的延伸方向，开张主枝角度以及调整枝序之间生长势的平衡。

疏删修剪是将枝条从基部完全剪除，主要用于处理生长过于密集的枝条。对于主枝延长枝，疏删其下过密的轮生枝，以便集中养分，保证延长枝的正常生长。疏删单位枝序的强枝，能够削弱该枝序的生长势，起到平衡树势、改善光照的作用。

### 北方种植

一般地说桂花广泛栽种于中国淮河流域及以南地区，其适生区北可抵黄河下游，南可至两广、海南。但是北京、青岛也能够种植桂花的。在“冯天哲”著作的“家庭养花300问”中就有说冬季在桂花的幼树入冬后浇一次防冻水并在树基部培土护根外，再用厚报纸7层包裹树干和枝条，就能在北京露天过冬了。三年后就不用过冬再包裹了。

### 桂花树不开花的原因

1、选苗不当：有一种紫桂要长大成树后才能开花，如果误将紫桂扦插成实苗都很难开花。桂花种苗应以良种成熟枝作为接穗的嫁接苗，或在带花的枝条甚至基部透过高压法取得得苗，不仅仅质好，成活后容易开花。这一点很重要，选取好了桂花苗在培养过程中才会更加方便，也不必苦恼桂花树为什么不开花了。2、栽培不当：桂花树喜沙子土最适宜，在碱性较高的土壤中往往很少开花。移栽时受根或是受冻，必削弱长势，3~5年内不能开花。桂花树喜光忌温，长期光照不足有可能不开花。土壤过湿烂根或长期高温干燥，也会影响花芽分化，这也是桂花树为什么不开花的原因中不可忽视的一点。3、肥料失衡：桂花树是一种喜肥植物，但对肥料也不是多多益善，每种植物都有氮、磷、钾等元素内需平衡的肥料成分比例。氮肥多了，枝繁叶茂，枝叶徒长，就是不开花。少了有叶黄枝瘦，影响对磷、钾肥的吸收，也不开花。所以规划尽量不用化肥，要多用农家肥，桂花树个性喜欢猪粪肥，谚语说“要使桂花香，打烂猪屎缸”。4、病害所致：桂花树怕氯气，不耐油烟。油烟大则生长不良，叶片变小脱落，不能开花。桂花树还易受炭疽病、介壳虫等病虫害危害，不及时治疗，同样影响开花。此外误剪春梢，会影响当年开花。盛开的桂花枝过多，会削弱长势，

影响以后开花。

#### 桂花养殖技术

1、选好盆土：桂花喜微酸性土壤。盆栽可选用山泥5份、腐殖土3份、沙土2份混合调制或用腐叶土和沙壤土各半作培养土。如土壤酸性过强，则生长缓慢，叶枯黄。若用碱性土，经2~3个月，即可导致叶片枯萎，甚至死亡。2、适时浇水：桂花浇水要掌握“二少一多”，即新梢发生前少浇水，阴雨天少浇水，夏秋季干旱天气需多浇水。平时浇水以经常持续盆土50%左右含水量为宜。阴雨天要及时排水，以防盆内积水烂根，否则易“淹死”。3、巧施追肥：桂花喜猪粪，花谚有“要得桂花香，多备猪粪缸”。如能从初春桂花出室后，即施用腐熟稀薄的猪粪液，4~5月约每10~15天施1次，6~7月每7~10天施一次，8月初施最后一次，则桂花生长茂盛，开花多且味香。城市没有猪粪，可用腐熟的饼肥液。如果施肥不足，则分枝少，花也少，而且不香。4、适当修剪：桂花根系发达，萌发力强，成年的桂花树，每年抽梢两次。因此，要使桂花花繁叶茂，需适当修剪，持续生殖生长和营养生长的生理平衡。一般应剪去徒长枝、细弱枝、病虫枝，以利通风透光，养分集中，促使桂花孕育更多、更饱满的花芽，则开花繁茂。

#### 桂花产地分布

桂花原产中国西南喜马拉雅山东段，印度、尼泊尔、柬埔寨也有分布，我国西南部、四川、陕南、云南、广西、广东、湖南、湖北、江西、安徽、河南等地均有野生桂花生长，现广泛栽种于淮河流域及以南地区，适生区北可抵黄河下游，南可至两广、海南等，并构成了安徽六安、湖北咸宁、湖南桃源、江苏苏州、广西桂林、湖北武汉、浙江杭州和四川成都几大全国有名的桂花商品生产基地。

#### 桂花产地环境

桂花适应于亚热带气候地区，性喜温暖，湿润，种植地区平均气温14~28℃，7月平均气温24~28℃，1月平均气温0℃以上，能耐最低气温-13℃，最适生长气温是15~28℃。湿度对桂花生长发育极为重要，要求年平均湿度75~85%，年降水量1000毫米左右，个性是幼龄期和成年树开花时需要水分较多，若遇到干旱会影响开花，强日照和荫蔽对其生长不利，一般要求每一天6~8小时光照。抗逆性强，既耐高温，也较耐寒，在中国秦岭、淮河以南的地区均可露地越冬。

#### 桂花四大品系

1、四季桂品种：四季桂丛生灌木状，树形低矮，分枝短密，树冠圆球形。新叶深红色，老熟叶绿色或黄绿色。叶片呈椭圆状阔卵圆形，叶片的主脉与侧脉之间的交角很大，接近垂直状态。花芽常单生或2~3枚叠生，每年9月至次年3月分批开花，花香不及银桂、金桂、丹桂浓郁。常见品种有大叶四季桂、小叶四季桂，四季开花有月月桂、日香桂、大叶佛顶珠、齿叶四季桂等品种。2、丹桂品种群：丹桂雌雄异株，树冠圆球形，树皮浅灰色，较平滑，皮孔稀疏。叶革质，长椭圆形或椭圆形，叶面较平整，叶缘反卷，全缘，先端偶有疏齿，基部宽楔形，先端钝尖或短尖，侧脉8~10对，网脉两面明显，叶柄长8~10毫米。花色橙红，花冠稍内扣，香味淡，花期9月下旬至10月上旬。有大花丹桂、齿丹桂、朱砂丹桂、宽叶红等品种。3、金桂品种群：金桂树冠圆球形，树势强健，枝条挺拔，十分紧密。树皮灰色，皮孔圆或椭圆形，春梢比较粗壮。叶色深绿，叶片椭圆形，叶面不平整，叶缘微波曲。花色黄，有浓香，不结实，秋季开花，花柠檬黄淡至金黄色。品种有大花金桂、大叶黄、潢川金桂、晚金桂、圆叶金桂、咸宁晚桂、球桂、圆瓣金桂、柳叶苏桂、金师桂、波叶金桂等。4、银桂品种群：银桂树冠圆球形，大枝开展，枝叶稠密，长势良好。树皮浅灰色，

皮孔多且大，形似雪花，十分明显。叶片绿色或深绿色，长椭圆或椭圆形，叶片较宽阔且厚实，叶面较平展。开花在9月上中旬，花色乳黄至柠檬黄，香气浓郁，花后不结实，秋季开花。品种有宽叶籽银桂、柳叶银桂、硬叶银桂、籽银桂、九龙桂、早银桂、晚银桂、白洁、纯白银桂、青山银桂等。

#### 红桂花和黄桂花的区别

丹桂(红桂花)花朵色彩橙黄，气味适中，叶片比起其他几种最厚，色彩较深。叶片色较浅金桂（黄桂花）：金桂花朵金黄，气味较浓，叶片较厚。叶片深绿。

金桂花朵为金黄色，且气味较丹桂要淡一些，叶片较厚。金桂秋季开花，花色主要以黄色为主（柠檬黄与金黄色）。其中金桂又分为球桂，金金桂球桂，狭叶金桂，柳叶苏桂和金秋早桂等众多品种。

红桂花其实就是丹桂，是人们根据花色来取名的，丹桂开花的色彩有好几种，其中有橙红色和朱红色，这就是大家叫的红桂花。红桂花花味香浓仅次于金桂、叶片较厚，花期在九十月之间，这是一个自然与人工合成的桂花品种。

#### 红桂花还还是黄桂花好

看个人需求吧，只是红桂做成的补品会比较贵哦！开红花的通常是指丹桂，开黄花的通常是指金桂，人们偏向开红花的丹桂，因它花红飘香深受种植者的喜爱。

更多资料阅读 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发